


La pyrale du maïs


Un ravageur à deux races



Les périodes d'apparition des stades de la pyrale du maïs peuvent varier selon la situation géographique et les conditions climatiques.

Race univoltine (1 génération par année)
Le plus souvent sur maïs mi-saison

Race bivoltine (2 générations par année)
Le plus souvent sur maïs hâtif et tardif



Pour une gestion intégrée de la pyrale

- Surveillez les avertissements du RAP.
- Visitez régulièrement vos champs.
- Préconisez l'emploi de moyens non chimiques de lutte, dont les trichogrammes.
- Rationalisez les traitements par l'échantillonnage séquentiel www.agrireseau.qc.ca/rap/documents/b04mai05.pdf.
- Privilégiez l'utilisation d'insecticides à faible risque pour la santé et l'environnement, à l'aide de SAgE pesticides : <http://beta.sagepesticides.qc.ca/>.

Autres cultures affectées par la pyrale du maïs

Pomme de terre



Pour en savoir plus : *Les insectes ravageurs importants de la pomme de terre au Canada*
www.agrireseau.qc.ca/pdt/navigation.aspx?id=75009

Poivron



Pour en savoir plus : *Poivron : piéger la pyrale du maïs à la ferme*
<http://www.agrireseau.qc.ca/rap/documents/b01s07.pdf>
Pyrale du maïs et bon moment pour pulvériser l'insecticide sur la culture du poivron
www.omafra.gov.on.ca/french/crops/hort/news/hortmatt/2003/14hr03a6.htm

Larve mature



Méthodes de dépistage :	Interventions phytosanitaires :
Piégeage	Lâchers de trichogrammes
Observations au champ	Pulvérisations d'insecticides
Programme d'échantillonnage séquentiel	Destruction des résidus de culture

Distribution des races univoltine et bivoltine de la pyrale du maïs

